






# Weinbaufax Franken

herausgegeben am  
**Donnerstag, 20. Juli 2017**

LWG Veitshöchheim  
Weinbauring Franken e.V.  
WEATHER365 Ltd

**Freitag:** Morgens, vormittags und bis zum Nachmittag hin weitgehend sonnig Frühtemperaturen bei 18 Grad, Höchstwerte später bei 27 Grad. Am späten Nachmittag und zum Abend hin gering bewölkt. Abendtemperaturen um 25 Grad. In der Nacht zunächst dicht bewölkt mit Regen. Gegen Mitternacht dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen. Danach meist wechselnd bewölkt, zeitweise sternklar. Es kühlt auf Werte um 19 Grad ab.

**Die weiteren Aussichten:** Samstag gering bewölkt. Höchstwerte 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag Tiefstwerte um 16 Grad. Sonntag oft gering bewölkt maximal 23 Grad.

© www.weather365.net	Fr	Sa	So	Mo	Di
<b>Wetter</b>					
<b>TMax / TMin [°C]</b>	27 / 16	28 / 19	23 / 16	23 / 13	20 / 15
<b>Niederschlag [mm]</b>	1	5	3	1	2
<b>Regenrisiko [%]</b>	0	40	40	30	40
<b>Bodenfeuchte [%nFK] 30-60cm Tiefe</b>	44	44	44	44	44
<b>Bodentemp. 40cm Tiefe [°C]</b>	16	17	17	16	16
<b>Pflanzenschutzmittel Sprühverluste (Grenzwert Wind 5 m/s)</b>	leicht 2,3 m/s	leicht 2,6 m/s	extrem 6,1 m/s	mittel 4,5 m/s	mittel 4,9 m/s

## Traubenwickler

Die Eiablage beim Einbindigen Traubenwickler ist beendet. Weitere Behandlungsmaßnahmen sind nicht notwendig.

Beim Bekreuzten Traubenwickler werden in den aktuell untersuchten Proben immer noch frisch abgelegte Eier in geringerer Zahl gefunden. Weiter werden in den Fallen immer noch Falter gefangen. Teils steigen die Flugzahlen wieder an. Eine weiter anhaltende Eiablage ist demnach nicht auszuschließen.

Die Wirkungsdauer der Präparate unter den gegebenen Verhältnissen (starke Volumenzunahmen der Beeren) beträgt bei Steward ca. 14 Tage, bei Coragen ca. 16 Tage, bei Mimic ca. 10 Tage und bei Xentari, Dipel ca. 8 Tage. Vom empfohlenen Behandlungstermin zwischen 8. bis 10. Juli ausgehend, geht jetzt auch die Wirkungsdauer bei den länger wirkenden Präparaten zu Ende. Unter Berücksichtigung der teils hohen Befallshäufigkeiten ist eine zweite Behandlung gegen den Bekreuzten Traubenwickler daher möglich, wenn man ganz sicher gehen will.

Aus Resistenzgründen sollte das Präparat gegenüber der vorhergehenden Behandlung gewechselt werden. Beachten Sie, dass Coragen nur einmal in der Vegetationsperiode zugelassen ist.

Behandlungen können durchgeführt werden mit Steward 0,2 kg/ha, Coragen 0,28 l/ha, Mimic 0,8 l/ha, Xentari oder Dipel ES 1,6 kg/ha.

## Hagel

In einigen Gemarkungen hat es Hagelschäden in der vergangenen Nacht gegeben. Da die Beeren noch nicht zuckerhaltig sind und in den kommenden Tagen zwar Schauer aber kein durchgehender Regen vorhergesagt wird, sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Die angeschlagenen Stellen werden eintrocknen.

Bei den kommenden Behandlungen können Präparate mit Botrytisnebenwirkung (Wirkstoff Folpet u.a.) vorzugsweise eingesetzt werden