




Erntezeitraum: 04.07. bis 20.10.2011  
 Pflanzenschutz: Nützlingseinsatz  
 Bestäubung: Hummelvolk  
 Vicare 0,2 % am 23.08.11  
 9 Anwendungen: Milsana 0,3 % und Trifolio S forte 0,25 %  
 gegen Echten Mehltau vom 01.08.11 bis 06.10.11

**Tab. 1: Sorte, Varianten, Frühertrag und Gesamtertrag**

Variante	Erziehungsformen	Frühertrag (4.07 - 18.07.2011) in kg/m <sup>2</sup>				Gesamtertrag in kg/m <sup>2</sup>			
		1. WH	2. WH	3. WH	Durchschnitt	1. WH	2. WH	3. WH	Durchschnitt
1	Layern vom hohen Draht	1,20	1,18	2,13	1,51	19,90	21,37	23,79	21,69
2	Kopfhaken	1,18	1,17	2,13	1,49	20,61	21,89	23,10	21,87
3	Layern vom niedrigen Draht	1,45	1,23	2,07	1,59	19,71	20,04	20,89	20,21
4	Schräg aufleiten	1,28	0,98	2,18	1,48	15,45	16,10	16,37	15,97

**Abb. 1: Kultursysteme für niedrige Spanndrahthöhen bei Tomaten 2011, Frühertrag**



**Abb. 2: Kultursysteme für niedrige Spanndrahthöhen bei Tomaten 2011, Gesamtertrag**

