

Weinbaufax Franken

LWG
Weinbauring Franken e.V.

Montag, 6. Juli 2026



Entwicklung

BBCH 75 - 77

Erbsengröße –
Beginn Traubenschluss



Kulturmaßnahme

Laubarbeiten

Trockenstress - Bewässerung

Pflanzenschutz

Traubenschluss-Behandlung

Allgemeine Situation



Die Temperaturen der letzten Tage waren mit Werten unter 30°C gemäßigt, sind aber nicht von Dauer. Die Prognosen zeigen ab Mitte der Woche wieder einen deutlichen Anstieg in Bereiche um und über 30°C. Niederschläge sind in dieser Woche nicht prognostiziert. Erste Welkeerscheinungen als Anzeichen für Wassermangel treten nun in Gebieten ohne ergiebigen Niederschlag auf.

Pflanzenschutz

Laubwandfläche ca. 15.000 m²/ha (ungefähre Angabe bei Standardsorte Müller-Thurgau)

Oidium:

Aufgrund der Witterung und des Entwicklungsstadiums waren die Infektionsbedingungen gut. Kontrollieren Sie daher Ihre Anlagen genau. Es werden Beerenbefälle gemeldet. Die Empfindlichkeit der Trauben nimmt ab Erbsengröße/ Beginn Traubenschluss ab.

Sollten Sie diese Woche eine Behandlung planen, wechseln Sie weiterhin die Wirkstoffgruppe (Resistenzstrategie). Achten Sie mit Blick auf Temperatur und Wind auf gute Applikationsbedingungen.

Mittel, z.B.	l oder kg/ 10.000m ² LWF	Wartezeit	Max. Anwendungen lt. Zulassung	Zulassungsnummer
Belanty (G)	1,0	21	2	00A480-00
Collis (L/A)	0,36	28	3	035203-00
Dynali (R/G)	0,44	21	2	007501-00
Talendo (J)	0,22	28	4	007414-00
Kusabi (K)	0,17	28	3	008467-00
Vivando (K)	0,18	28	3	025628-00

Bei den empfohlenen Mitteln hat sich letzte Woche bei Vivando der Fehlerteufel eingeschlichen: die Wirkstoffgruppe von Vivando ist „K“!

Peronospora:

In Gebieten mit erhöhten Niederschlägen in der letzten Woche können sowohl Primärinfektionen als auch Sekundärinfektionen stattgefunden haben. Die Inkubationszeit ist nun abgelaufen und Ölflecke zeigen erfolgreiche Infektionen an. Da die Trockenheit anhalten soll sind die Infektionsbedingungen für Peronospora überschaubar.

Zusätzlich verlieren die Beeren ihre Anfälligkeit gegenüber Peronospora. Um dennoch wirksamen Schutz des Zuwachses zu gewährleisten, sind Kontaktmittel ausreichend.

Empfohlene Präparate für eine anstehende Peronospora-Behandlung:

Mittel, z.B.	l oder kg/ 10.000m ² LWF	Wartezeit	Max. Anwendun- gen lt. Zulassung	Zulassungsnum- mer
Delan WG *	0,44	49	8	004424-00
Delan SC	0,40	42	4	00B376-00
Folpan 80 WDG	0,89	35	8	024459-00
Folpan 500 SC	1,33	35	8	024256-00

*Bitte beachten: Aufbrauchfrist Delan WG – nur noch in diesem Jahr einsetzbar!

Traubenwickler

Die 2. Generation des Bekreuzten Traubenwicklers befindet sich im Flugstadium! Bitte kontrollieren Sie weiterhin ihre Köderfallen und melden Sie die Fangzahlen.

Schwarzholzkrankheit:

Die Flugzeit der Windenglasflügelzikade endet erst Ende Juli bis Mitte August. Vermeiden Sie bis dahin Brennessel und Winde (sog. Wirtspflanzen) zu bekämpfen (mit Herbizid/ mechanisch) und somit die Zikade zu zwingen, sich auf die Suche nach neuen Nahrungsquellen zu begeben.

Kulturmaßnahmen



Anlagen, die Trockenstresssymptome zeigen, sind zu entlasten (Kümmertriebe und kurze Triebe entfernen, Laubwand und damit Verdunstungsfläche reduzieren) und gegebenenfalls mit Wasser zu versorgen.

Laubwandarbeiten wie Entblätterung und Vereinzelung der Trauben sorgen für gute Applikationsbedingungen, ein gutes Mikroklima und haben eine positive Auswirkung auf die Qualität.

Mit Blick auf die kommende Witterung sollten die Entblätterungsmaßnahmen moderat erfolgen, um Sonnenbrand vorzubeugen.