



Rebschutzleitfaden 2026

Die Tab. 8b zeigt die empfohlenen Zeitpunkte für den Einsatz der verschiedenen Präparate je nach Vorjahresbefall. Es ist keine empfohlene Abfolge an Präparaten, sondern stellt die Auswahlmöglichkeiten je nach Entwicklungsstand der Rebe dar.

Tab. 8b Einsatzzeitpunkte der Oidiumpräparate

Vorblüte	letzte Vorblüte	Abg. Blüte bis Trauben gehen in den Hang	um Traubenschluss	bis Abschluss
Gewanne mit Oidiumproblemen 2025				
Netzschwefel mit zug. AWM ab 8 kg/10.000 m ² LWF		Sercardis (L) Collis (A, L)	Talendo (J, extra (G))	Topas (G)
	Belanty (G)			
	Prosper TEC (H)			
	Vivando (K)	Kusabi (K)		
	Dynali (R/G)			
Gewanne ohne Oidiumprobleme 2025				
Netzschwefel mit zug. AWM ab 8 kg/10.000 m ² LWF		Sercardis (L) Prosper TEC (H)	Talendo (J, extra (G))	Topas (G)
	Belanty (G)			
	Talendo (J, extra (G))	Kusabi (K) Vivando (K)		
		Collis (A, L) Dynali (R/G)		
Laubarbeiten zeitgerecht durchführen, Entblätterung kurz nach der Blüte				

zug. AWM = zugelassene Aufwandmenge

Wirkstoffgruppen werden durch verschiedene Farben gekennzeichnet, beachten Sie jedoch auch die einzelnen Buchstaben (Buchstabe = Kat. Tab. 10).